

Biopsie-Schnelltest zum Nachweis der Laktose Unverträglichkeit in nur 20 Minuten im Rahmen einer Magenspiegelung.

## Hintergrund – Laktose Intoleranz

Die Laktose Intoleranz resultiert aus der Unfähigkeit, Laktose (Milchzucker) aus Milchprodukten zu verdauen. Als Ursache gilt ein Mangel des Enzyms Laktase, das im Dünndarm produziert wird.

Laktose (Milchzucker) findet sich in fast allen Milchprodukten wie z.B., Sahne, Quark, Joghurt, Eis und Käse.

Laut Schätzungen leiden 20 % der West- und Nordeuropäer, sowie 90 % der übrigen Weltbevölkerung an Laktose Intoleranz.

Die Laktose Intoleranz kann zu folgenden Beschwerden führen:

- Blähungen
- abdominales Völlegefühl, Krämpfe und Schmerzen
- Durchfall

Im Rahmen einer Magenspiegelung kann jetzt schnell die Laktose Intoleranz diagnostiziert werden. Der patentierte und zugelassene Test der Firma Biohit (Patent-Nr. DE 600 12 723 0) beruht auf der Analyse einer Biopsieprobe. Mit Hilfe von Reagenzien wird durch eine Farbreaktion innerhalb von nur 20 Minuten eine mögliche Intoleranz gegenüber Milchzucker nachgewiesen.



20 min.

## Ihre Vorteile

- der Schnelltest kann sofort während der Magenspiegelung durchgeführt werden und erspart somit weitere Tests
- der alternative H<sub>2</sub> - Atemtest, an einem neuen Termin, dauert dagegen 4 Stunden

Wir berechnen Ihnen nur die Materialkosten von 35 €, da der Test nicht von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen wird.